

Уважаемые родители!

Обращаем Ваше внимание, что начинается ежегодная профилактическая иммунизация против гриппа в осенне-зимний период. В соответствии с Федеральным законом № 34-ФЗ от 08.12.10г. (Приложение №2) прививки против гриппа введены в Национальный календарь профилактических прививок. Специфическая профилактика гриппа проводится отечественной вакциной «Ультрикс® Квадри» у детей, начиная с 6-месячного возраста, дошкольников, подростков и далее без ограничения возраста.

Вакцина особенно показана:

1. Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;
- страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечнососудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом иммунодефицита человека...

2. Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:

- учащимся образовательных учреждений, студентам;
- работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д.

Вакцина «Ультрикс® Квадри» является четырехвалентной инактивированной расщепленной, то есть представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов вирусов гриппа типа А (подтипы A(H1N1) и A(H3N2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria). Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Не содержит консерванта. Упакована в шприц-дозу. Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Применение: Детям с 6 месяцев до 3-х лет вакцину вводят внутримышечно по 0,25 мл (1/2 дозы) двукратно с интервалом 3-4 недели. Детям старше 3-х лет и прочим вакцину вводят внутримышечно однократно в дозе 0,5 мл. Вакцинируемый должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 минут после иммунизации. Вакцина может применяться одновременно с другими вакцинами, кроме вакцин против туберкулеза.

Противопоказания:

- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;
- аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;
- сильная реакция (температура выше 40 °C, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии;
- при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- детский возраст до 6 мес. с осторожностью.

Побочные действия. Вакцина является высокоочищенным препаратом, обычно переносится хорошо. Редко в месте введения может быть болезненность, отек, покраснение кожи, возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, которые обычно исчезают самостоятельно через 1-2 дня и не требуют лечения.

**Помните, что лучшая профилактика – это специфическая профилактика, то есть
вакцинация!**